


cumdente  
**»»» clickator®**



- > Zahnprothesen fixieren, Brücken befestigen, gaumenfrei versorgen
- > Auch in hohem Alter
- > Ohne aufwendige Operation
- > Auch ohne neue Prothese
- > Erstaunlich preisgünstig

## »»» Die neue Generation der Implantate macht Click




Der Name **Clickator**® rührt daher, dass in die Basis der Prothese bzw. Brücke eine Art Druckknopf-Halter (Clickator®-Matrize und Retainer) eingebaut wird, wodurch die Prothese auf die Implantate in engem Kontakt mit der Schleimhaut »einclickt«. Clickator®-fixierte Prothesen halten auch bei fortgeschrittenem Knochenabbau und bewegen sich beim Essen nicht. Auf störende Gaumenplatten im Oberkiefer kann oft verzichtet werden. Auch setzen sich nicht ständig Speisereste unter die Prothese, die nur noch zum Zähneputzen abgenommen wird.

Die Cumdente Clickatoren gibt es für viele Implantatsysteme und für spezielle Miniimplantate, die auch bei weit abgebautem Kieferknochen eingesetzt werden können. Die Implantation selbst gelingt so oft ohne aufwändige Operation. Clickatoren können mit der vorhandenen (alten) Prothese verbunden oder im Zuge der Neuanfertigung einer Prothese oder Brücke eingesetzt werden. Auch eine Kombination mit Teleskop-Prothesen sowie deren einfache Instandsetzung bzw. Erweiterung ist möglich.


# »»» Mit Clickatoren beginnt ein neues Lebensgefühl



Fallbeispiele:



## »»» Und so gehts...



**Cumdente Implantate oder Miniimplantate** werden mit einem minimal-invasiven Eingriff unter lokaler Betäubung (normale Spritze) in den Kiefer eingebracht. Vor der Behandlung müssen Sie sich nicht fürchten. Nach der Planung am Röntgenbild oder am Computer erlaubt ein etwa Fingernagel breiter Schnitt den Zugang zum Kieferknochen. Aufwändige Techniken des Knochenaufbaus können oft entfallen. Meistens dienen zwei Nähte dem Wundverschluss. Blutgerinnungshemmende Medikamente können in vielen Fällen sogar beibehalten werden.

Nachbeschwerden bestehen üblicherweise nicht. Oft genügen 2, manchmal 3 bis 4 Implantate im Ober- und im Unterkiefer, um die Prothesen sicher zu verankern. Zur Realisation einer gaumenfreien Prothese im Oberkiefer sind vier Implantate erforderlich. Auch für vorhandene Implantate sind vielfach Clickatoren erhältlich.

**Sprechen Sie uns an!**

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Zahnarzt.

Überreicht von Ihrem Zahnarzt:

**Cumdente GmbH**  
Paul-Ehrlich-Straße 11  
72076 Tübingen, Germany  
[www.cumdente.de](http://www.cumdente.de)

Praxisstempel

Stand: Februar 2013

9000050